

Patient information: karsprængninger med LASER/IPL

Behandling generelt

Det er vigtigt, at man ikke er brun, når man møder til behandling. Derfor skal man undgå solbadning og solarium i mindst 6 uger før start af behandling, i hele behandlingsperioden og i mindst 6 uger efter sidste behandling. Brug solcreme med høj faktor (faktor 50-60 med både UVA og UVB filter) ved udsættelse for sollys i området, der behandles. Huden kan ikke behandles, hvis den er tydeligt solpigmenteret, og den må ikke være farvet af selvbruner eller brun creme.

Bivirkninger:

Ved udsættelse af huden for varme vil der kan forekomme rødme, hævelse, pigmentforandringer, forbrændinger og evt ar dannelse. Hævelse kan fremkomme under og omkring øjnene. I enkelte tilfælde kan denne hævelse være langvarig. Hvis en kunde har nogen små hyper pigmenteringer, fregner eller andet misfarvninger (typisk brune pletter) i behandlingsområdet, er det meget vigtigt at vide, at disse ”brune” områder, kan blive ret mørke i ca 1-2 uger hvorefter de forsvinder – så man får faktisk 2 behandlinger i en. Nemlig fjernelse af karsprængninger samt hudforyngelse.

Fjernelse af karudvidelse

Det specielt producerede lys trænger ind i huden, hvor det optages af det røde hæmoglobin i de tynde, overfladiske blodkar. Lyset omdannes til varme, og karrene ødelægges indenfor en tusindedel af et sekund. Efterfølgende bliver de fjernet af hudens reparationssystemer. Effekten af behandlingen er som regel god, men kan variere fra person til person, afhængigt af karrenes beskaffenhed, lokalisation og årsag. Ofte er det nødvendigt med gentagne behandlinger med nogle måneders mellemrum. **Hos nogle få kan karrene ikke fjernes**, og behandlingen fjerner ikke en evt. tendens til at danne nye karudvidelser. Det kræver oftest at man får gentaget behandling 2-3 gange om året.

Behandlingseffekt

Der kræves normalt ingen efterbehandling. I modsætning til den gammeldags laser får du ikke blå mærker efter behandlingen. Huden i det behandlede område kan hæve lidt, og blive rød og varm. Du kan ligeledes få en svidende let brændende fornemmelse i huden. Det skyldes, at der i karvæggen sidder celler, der indeholder et stof, der hedder histamin. Disse celler bliver ødelagt samtidig med karvæggen, og histaminet trænger ud i vævet, og giver den svidende fornemmelse. Alle disse gener forsvinder i løbet af nogle timer eller dage. De kan lindres med fx kolde omslag. I sjældne tilfælde kan hævelsen være mere udtalt. Dette ses specielt efter første behandling, hvor mange kar ødelægges på én gang.

Inden behandlingen er det altid vigtigt at vide, at vi kan fjerne de kar-sprængninger som er i området, men vi ikke bremse udvikling af yderligere karsprængninger i område, da disse ville komme frem under alle omstændinger, derfor må kunden forvente vedligeholdelsesbehandlinger med tiden. Det kræver i gennemsnit 2-3 behandlinger om året.

Hvornår kan man ikke behandles

1. Hvis du er i behandling med medicin, der øger lysfølsomheden (fx visse malariamidler, tetracyclinpræparater og klorpromazin-derivater)
2. Patienter, som behandles med disse typer præparater, kan eventuelt efter aftale med behandlende læge holde pause i ca. 1 uge inden IPL behandling
3. Hvis du er gravid
4. Hvis du har pacemaker

Vigtigt:

Kunden skal have læst denne information før behandlingen ellers kan vedkommende ikke få behandling. Under konsultationen patienten skal acceptere at vedkommende vil downloade og læse denne information igennem inden behandling.